

# Avertissements ILE DE FRANCE agricoles



ISSN 0767 - 5542

## Grandes cultures

BULLETIN N° 593 DU 2 OCTOBRE 1990 - ENVOI N° 26

COLZA : Desherbage de post levée  
Pucerons : Vol peu intense  
Altises : Surveillez car météo  
favorable à la ponte

### COLZA

■ **STADE** : Levée à 3ème feuille naissante suivant les dates de semis .

■ **RAPPEL** : Nous vous déconseillons l'emploi de tous régulateurs ou fongicides à l'automne .

#### ■ **RAVAGEURS** :

\* **Situation** : Les captures de pucerons verts ou cendrés sont encore très faibles à la tour à succion de Versailles (quelques ailés par semaine). Sur repousses de colza, on observe par contre d'anciennes colonies de pucerons cendrés.

L'infestation en grosses altises est variable : faible sur Mantes la Jolie; le seuil d'intervention (1 plante sur 3 avec morsures) est parfois atteint dans le Sud Seine et Marne.

\* **Préconisation** : Les conditions météorologiques favorables à la croissance rapide des colzas et l'infestation faible en pucerons, font qu'un traitement n'est pas justifié actuellement .

Surveillez de près les altises, car la douceur et l'humidité favorisent l'activité de ponte; et traitez dès que le seuil est atteint .

750



# HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DES CULTURES DE COLZA

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES (FIRMES)	DOSES/HA	OBSERVATIONS
carbétamide	LEGURAME PM (RHODIAGRI LITTORALE)	3 kg	- Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. - Application sur sol gelé - Essentiellement antigraminées.
		5 à 6 kg	- Contre chiendent de Novembre à fin Janvier.
propyzamide	KERB Flo (ROHM ET HAAS)	1,25 l	- A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. - Application sur sol gelé - Essentiellement antigraminées.
propyzamide + diuron	KERB ULTRA (ROHM ET HAAS)	1,2 kg	- A partir du stade 4 feuilles bien développées, 6 <sup>e</sup> feuille naissante des colzas sains bien implantés. - De préférence avant l'hiver - Utiliser par temps humide, couvert, frais. - Antigraminées et action limitante sur Sanves, Ravenelles.
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS (RHODIAGRI LITTORALE)	3,5 kg	- A partir stade 6 feuil. vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. - Application possible sur sol gelé - Antidicotylédones et antigraminées.
diméfuron + clopypalid	CLERDONE (RHODIAGRI LITTORALE)	2,5 l	- Sur colza sain, bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir stade 4 feuilles vraies du colza. - Antidicotylédones. - Ne pas utiliser en mélange avec un antigraminée à action foliaire, respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. - Mélange possible avec un antigraminée à action racinaire. - Programme de traitement : Capselle : BUTISAN 1,5 l post-semis, CLERDONE 2,5 l post-levée. Géranium : DEVRINOL 2,2 l post-semis, CLERDONE 2,5 l post-levée.
clopypalid	LONTREL SF 100 (SCHERING)	1,2 l	- De la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux. - Spectre : composées et légumineuses. - Dose d'emploi : 0,75 l à 1,25 l avec 3 l d'huile Schering.

LES ANTIGRAMINEES A ACTION FOLIAIRE SUR COLZA : Ils s'utilisent quelque soit le stade du colza, à partir du stade 3 feuilles des graminées. La végétation doit être active et la température comprise entre 10 et 20° pour une pénétration et une systémie optimale de la matière active. Contre les graminées vivaces, il est nécessaire de doubler les doses. La dose d'huile est modulable en fonction des conditions climatiques.

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES (FIRMES)	DOSES/HA	OBSERVATIONS
alloxydime- sodium	FERVIN (SCHERING)	1 kg + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées annuelles.
		1 à 1,25 kg + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées vivaces.
sethoxydime	PERVINAL (SCHERING)	2 l + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 3 l huile (SCHERING)	- Sur graminées vivaces.
fluazifop- p-butyl	FUSILADE X2 + AGRAL (SOPRA)	0,75 l + 0,1 % AGRAL	- Sur graminées annuelles.
		1,5 l + 0,1 % AGRAL	- Sur graminées vivaces.
haloxyfop- éthoxyéthyl	GALLANT (DOW ELANCO)	1 l	- Application à l'automne uniquement. - Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces et pâturins.
quizalofop-éthyl isomère D	TARGA D+ (PEPRO)	0,5 l + 2 l huile (SIPREN)	- Sur graminées annuelles.
		1,25 l + 2 l huile (SIPREN)	- Graminées vivaces stade 15-20 cm, pâturins 3 feuil. maximum, ray-grass après tallage.
cycloxydime	STRATOS (BASP)	1,25 l + 2 l huile 970	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 2 l huile 970	- Sur graminées vivaces.
propaquizafop	AGIL (LA QUINOLEINE)	1,2 l	- Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces.